

## Hoito-ohje koiran leikkauksen jälkeen

1. Haavan nuolemisen esto on erittäin tärkeää. Koira ei saa nuolla haavaa niin kauan kuin haavassa on tikit, nuoleminen estetään kaulurilla. Vaikka poistettavia tikkejä ei olisi, tulee haava suojata nuolemiselta 10 päivää. Jos koira (tai muut kotieläimet) pääsevät nuolemaan haavaa, se voi tulehtua ja toipuminen pitkittyä. Kaulurin voi ottaa pois ulkoilun ajaksi, kunhan koira on kiinni taluttimessa.
2. Haavan päälle on laitettu teipeillä side, jonka voitte itse poistaa 2-4 päivän kuluttua. Jos side kastuu tai likaantuu, on se poistettava heti. Teippi irtoaa helpommin, kun sen kastelee vedellä märäksi ennen sen poistamista.
3. Haava ei saa kastua eikä likaantua. Jos haava likaantuu, se suihkutetaan lämpimällä vedellä, kuivataan kevyesti ja puhdistetaan Betadine-paikallisantiseptillä (apteekista ilman reseptiä).
4. Koira tulee majoittaa sisätiloihin 10 päivää leikkauksen jälkeen. Tänä aikana koira saa ulkoiluttaa vain valvotusti hihnassa.
5. Antibioottilääkitys: \_\_\_\_\_  
Kipulääkitys: \_\_\_\_\_  
Lääkitykset aloitetaan leikkausta seuraavana päivänä. Lääkkeitä ei tule antaa tyhjään mahaan.
6. Tikit poistetaan 10-14 päivän kuluttua / Poistettavia tikkejä ei ole.  
Tikkien poistoaika \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.2010 Kello \_\_\_\_.
7. Koiran heräämistä tulee seurata tapaturmien välttämiseksi. Koiralle laitetaan peti lattialle, ettei se pääse herätessään putoamaan. Ruumiinlämmön ylläpitäminen on tärkeää nukutuksen jälkeen, tarvittaessa sen päälle laitetaan peitto. Kaula ja pää tulee suoristaa hengityksen helpottamiseksi. Herätessään koira saattaa virtsata alleen. Siksi koira on hereillä, on se hyvä käyttää pikaisesti ulkona tarpeillaan.
8. Kun koira on täysin hereillä, sille voi tarjota vettä. Ruokaa ei anneta leikkauspäivänä.
9. Tarkkaile, että koira saa ulostettua leikkausta seuraavina päivinä. Mikäli ummetusta ilmenee, voi sen laukaisemiseksi antaa parafiiniöljyä suun kautta 5 ml kolmesti päivässä enintään kolmen päivän ajan.
10. Ottakaa yhteyttä klinikalle jos ilmenee pahoinvointia, voimakasta vuotoa haavasta, tulehduksen merkkejä (punoitus, turvotus, kuumotus, kipu) tai jos käytöksessä tai olemuksessa havaitaan epänormaalia (ei syö/juo, apea, ei ulosta/virtsaa).
11. **Huom! Sterilaatio-/kastraatioleikkauksen** jälkeen koiran aineenvaihdunta muuttuu, joten se on herkempi lihomään. Tarkkaile koiran painoa ja muuta ruoka-annoksia tarvittaessa. Liikakilot tuovat mukanaan terveydellisiä ongelmia.

**MUUTA HUOMIOITAVAA** \_\_\_\_\_

Tarvittaessa annamme neuvoja mielellämme. Pikaista paranemista!