

TIETOISKU KOIRANPENNUN OMISTAJALLE

Käsittely:

Koiranpennun käsittely kotona on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta ajatellen! Mahdolliset eläinlääkärikäynnit, näyttelyt, kokeet ja hoitotoimenpiteet kotona ovat huomattavasti paljon helpompia, kun koira on totutettu käsittelyyn. Eli katsotaan korvat, silmät, suu, tassut, hännänalus (kivekset) ja kylässä käyvät vieraat voivat tehdä saman. Näin ne tottuvat myös vieraampien ihmisten käsittelyyn.

On normaalia että jossain vaiheessa koira saattaa protestoida hoitotoimenpiteitä vastaan. Aloitettu toimenpide, kuten kynsien leikkaus, tulee hoitaa varmoin ottein loppuun. Kun pentu pyristelee vastaan, sitä ei tule päästää irti – muutoin se pyristelee ensi kerralla vielä kovemmin.

Koiranpennun maitohampaiden tulisi vaihtua noin puoleen ikävuoteen mennessä. Hampaiden vaihtumista on syytä tarkkailla varsinkin pienikokoisilla koirilla. ”Juuttuneet” hampaat voivat muuttaa koiran purentaa ja aiheuttaa tulehduksia, joten ne tulee poistaa rauhoituksessa. Suuhun katsomista tulee harjoitella kotona aluksi vaikka päivittäin.

Ruokinta:

Suosittelemme että koiranpennut ruokitaan eläinkaupasta hankitulla täysiravinnolla tai koiralle sopivalla kotiruoalla (esim. Yrjölän puuro). Ei ihmisten ruoan tähteitä, eikä eineksiä. Jos koiralle syötetään pelkkää kotitekoista ruokaa, tulee siihen lisätä mineraalit, hivenaineet ja vitamiinit.

Sisäloisten häätö:

Koiranpennulle on syytä antaa matolääkkeet kasvattajalta tulon jälkeen vähintään kerran ennen ensimmäistä rokotusta, viimeistään viikkoa ennen rokotusta. Lääkitys uusitaan kahden viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta. Matolääkkeeksi pennulle sopii esim. Flubenol ja Axilur.

Rokotukset:

Koiranpentu rokotetaan nelosrokotteella (penikkatauti, parvovirus, tarttuva maksatulehdus ja kenneluskä) ensin 12 viikon iässä ja sama rokote tehostetaan 16 viikon iässä. Suosituksena on antaa raivotautirokote erikseen aikaisintaan 19 viikon ikäisenä. Tämän jälkeen koira rokotetaan seuraavan kerran kun se on täyttänyt yhden vuoden.

HUOM! Koiran tulee olla perusterve rokotuksia annettaessa, eli esim. ripuloivaa, yskivää koiranpentua ei voida rokottaa, vaan se pitää hoitaa terveeksi ennen rokotuksia. Ottakaa yhteyttä klinikalle jos epäilette että pennulla saattaisi olla jotain, mikä voisi estää rokotuksen antamisen.

Koiranpennun sosiaalistamisen kannalta on tärkeää että se tapaa jo pienenä muita koiria. Koirapuistoihin tms. koiran voi viedä rokotusten puolesta vasta 18 viikon iässä, mutta rokotettuja, terveitä ja kilttejä koiria on hyvä tavata jo tätä ennen.

Rokotuksien sivuvaikutuksena:

Rokotuskohtaan voi nousta pieni patti ja niskaa saattaa kutittaa. Kun vasta-aineet alkavat nousta viikon-kahden kuluttua, voi pennulla olla yksi väsynyt päivä, jolloin ruokakaan ei maistu ja se saattaa olla kuumeinen. Jos tämä kestää vain päivän, ei ole syytä huolestua.

Vakava allerginen reaktio rokotteelle tulee lähes välittömästi rokotteen annosta, jolloin koira tarvitsee eläinlääkäriin hoitoa nopeasti. Rokotuksen jälkeen kannattaa pennun kanssa odotella klinikan läheisyydessä 15-30 minuuttia ja seurata mahdollisia reaktioita. Reaktiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Lisää hoito-ohjeita, ensi-apuohjeita ja koiran kotiapteekin tarvikkeet löydät:

www.elainklinikkakurki.fi