

Hoito-ohje kissan leikkauksen jälkeen

1. Haavan nuolemisen esto on erittäin tärkeää. Kissa ei saa nuolla leikkaushaavaa 10 päivään, nuoleminen estetään kaulurilla tai paidalla. Jos kissa (tai muut kotieläimet) pääsevät nuolemaan haavaa, se voi tulehtua ja toipuminen pitkittyä. Kaulurin tai paidan voi tarvittaessa poistaa päivittäin hetkeksi, jotta kissa saa pestä itsensä. Tällöin on mahdollista, ettei se nuole haavaa.
2. Leikkaushaavan päälle on laitettu teipillä side estämään turvotusta ja suojaamaan haavaa. Side poistetaan kotona 2-4 päivän kuluttua leikkauksesta. Jos side kastuu tai likaantuu, on se poistettava heti.
3. Haava ei saa kastua eikä likaantua. Jos haava likaantuu, se suihkutetaan lämpimällä vedellä, kuivataan kevyesti ja puhdistetaan Betadine-paikallisantiseptillä (apteekista ilman reseptiä).
4. Kissa tulee pitää sisällä 10 päivää leikkauksen jälkeen.
5. Kissalle on annettu kipulääkeinjektio leikkauksen yhteydessä.
Jatkolääkitys: antibiootti: _____
kipulääke: _____
Lääkitykset aloitetaan leikkausta seuraavana päivänä. Lääkkeitä ei tule antaa tyhjiin mahaan.
6. Tikin/ tikkien poisto 10 päivän kuluttua/ Poistettavia tikkejä ei ole.
Tikkien poistoaika ____ ____/____. 2010 klo ____.
7. Nukutusaineen vaikutus on yksilöllinen, kissa voi nukkua kotona vielä 1-3 tuntia. Nukutusaineen vaikutuksesta kissa nukkuu silmät auki, silmissä on kostutustipat.
Kissan heräämistä tulee seurata tapaturmien välttämiseksi. Kissalle laitetaan peti lattialle.
Ruumiinlämmön ylläpitäminen on tärkeää nukutuksen jälkeen, tarvittaessa kissan päälle laitetaan peitto.
Kaula ja pää tulee suoristaa hengityksen helpottamiseksi. Herätessään kissa saattaa oksentaa tai virtsata alleen.
8. Kissalle voi tarjota vettä kun se on täysin hereillä, ruokaa tarjotaan vasta seuraavana päivänä.
9. Tarkkaile, että kissa saa ulostettua leikkausta seuraavina päivinä. Mikäli ummetusta ilmenee, voi sen laukaisemiseksi antaa parafiiniöljyä suun kautta 1 tl kolmesti päivässä enintään kolmen päivän ajan.
10. Ottakaa yhteyttä klinikalle jos ilmenee pahoinvointia, voimakasta vuotoa haavasta, tulehduksen merkkejä (punoitus, turvotus, kuumotus, kipu) tai jos käytöksessä tai olemuksessa havaitaan epänormaalia (ei syö/juo, apea, ei ulosta/virtsaa).
11. Haavassa voi esiintyä 1-2 viikon kuluttua turvotusta, joka johtuu usein ihonalaisen ompeleiden sulamisesta. Seurata tilannetta mikäli kissa voi hyvin eikä tulehduksen merkkejä ilmene.
12. **Huom! Sterilaatioleikkauksen** jälkeen kissan aineenvaihdunta muuttuu, joten se on herkempi lihomään. Tarkkaile kissan painoa ja muuta ruoka-annoksia tarvittaessa. Liikakilot tuovat mukanaan terveydellisiä ongelmia.

MUUTA HUOMIOITAVAA _____

Tarvittaessa annamme neuvoja mielellämme. Pikaista paranemista!